लक्ष्मी सीड्स

ਜਵੀ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ





ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਮਾਂ

KENT OATS







ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂਮੀ

'ਕੈਂਟ' (Kent) ਜਵੀ ਲਈ ਠੰਢੇ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ।

ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਖੇਤ ਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਵਾਹ ਕੇ ਨਦੀਨ-ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਹਾਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ।



ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਜ਼ੀਰੋ-ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 25-30 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ।



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ (1 ਕਿਲੋ ਰਾਈ ਨਾਲ ਰਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ)।



ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ

ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 4-5 ਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਰੂੜੀ ਦੀ ਖਾਦ ਜਾਂ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (33 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ) ਅਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ (50 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ) ਪਾਓ, ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (33 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ) ਹੋਰ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ (44 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ) ਪਾਓ।



ਸਿੰਚਾਈ

ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।



ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਨਾ ਛਿੜਕੋ।



ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਚਾਰੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ, ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ 55-65 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋ।



ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਪਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕਾਰਕ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

