



ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਮਾਧਵ ਜੌਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਸੁਝਾਅ

ਝਾੜ 26 ਤੋਂ 30 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ।



ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਜੌਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਿਸਮਾਂ

ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੁਪਰ

ਮਾਧਵ

ਖੇਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਮਾਧਵ
ਰਿਸ਼ਰਵ ਗੌਂ ਵੀਜ਼
ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼ ਕਾਰਪੋ., ਭੀਲਗਾਨਗਰ



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਬਿਜਾਈ ਰਬੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਜਾਈ ਲਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਉਪਜਾਊ, ਬਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ, ਖਾਰੀ ਜਾਂ ਲੂਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡੂੰਘਾ ਵਾਹਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਵਾਇਤੀ ਹਲ, ਕਲਟੀਵੇਟਰ ਜਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 2-3 ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਵਾਹਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵਾਹਣ ਸਮੇਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਚਾਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ (ਪਲੇਵਾ) ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰੋ।



ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੌਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ 35-40 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 40-45 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੀ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੌਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ (ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਕੇ) ਨਾ ਬੀਜੋ; ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੀਡ ਡਰਿੱਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 22 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੌਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 'ਜ਼ੀਰੋ-ਡਰਿੱਲ' ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 'ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲੇਜ' (ਬਿਨਾਂ ਵਾਹੇ ਬਿਜਾਈ) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।



ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2.5 ਤੋਂ 3 ਟਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ-ਸੜੀ ਗੋਹੇ ਦੀ ਖਾਦ ਪਾਓ। ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 40 ਕਿਲੋ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਅਤੇ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਓ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਂ 35 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 20-25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਹੋਰ ਪਾਓ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਪੌਦੇ ਲੰਬੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਪਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 15-20% ਘਟਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਖਾਦ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਨੋਟ: ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁੱਲ 40 ਕਿਲੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਪਾਓ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਣਨ ਦੌਰਾਨ।



ਸਿੰਚਾਈ

ਹਲਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਮਟ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 25-30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਦਾਣੇ ਭਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।



ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਜੌਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।
ਆਈਸੋਪ੍ਰੋਟਿਊਰੇਨ + 2,4-ਡੀ / ਮੈਟਸਲਫਿਊਰੇਨ ਜਾਂ ਸਲਫੋਸਲਫਿਊਰੇਨ + ਮੈਟਸਲਫਿਊਰੇਨ।



ਕਟਾਈ

ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਜਾਣ।

ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।



ਟਿੱਪਣੀ

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਵਾਯੂ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੈ।

