



ਲਕਸ਼ਮੀ ਸੀਡਜ਼

ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ





लक्ष्मी सीड्स

ਮੇਠ ਦੀ ਕਿਸਮ ਬਾਰੇ ਖੋਜ

RMO-40



ਖੇਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ

ਮੇਠ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹਲਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੇਤਲੀ-ਦੋਮਟ ਅਤੇ ਰੇਤਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀਆਂ ਇਸ ਫਸਲ ਲਈ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈਰੇ ਅਤੇ ਹਲ ਚਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਹਾਗੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਮੇਠ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਲਦੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 45 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਬੀਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ

6 ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਬੀਜ ਦੀ ਦਰ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।



ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ

ਮੇਠ ਫਲੀਦਾਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. (DAP) ਅਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਯੂਰੀਆ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।



ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ

ਜਦੋਂ ਮੋਠ ਦੀ ਫਸਲ 25 ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ, ਵਿਭਾਗੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਵੇਂ ਨਦੀਨ-ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।



ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਜਦੋਂ ਫਲੀਆਂ ਪੱਕਣ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਸ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।



ਕ੍ਰਿਪਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਨੋਟ: ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ, ਖੇਤਰੀ ਪਰੀਖਣਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਜਰਬਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹੈ।

